

I_ تقديم .

(1) – الأعداد العشرية الموجبة و الأعداد العشرية السالبة :

* تعريف 1 :

الأعداد مثل : 0 ; 1 ; 2 ; 14 , 3,14 ; 11 ; 2,5 تسمى أعدادا عشرية موجبة .
الأعداد مثل : 0 ; -2 ; -1 ; -0,44 ; -12 ; -2,5 تسمى أعدادا عشرية سالبة .

* ملاحظة هامة : - العدد 0 هو عدد عشري موجب و سالب في آن واحد .

(2) – الأعداد العشرية النسبية :


* تعريف 2 :

الأعداد العشرية الموجبة و الأعداد العشرية السالبة تكون الأعداد العشرية النسبية

* ملاحظة هامة : - الأعداد مثل : 0 ; 1 ; 8 , 2 ; -14 ; -1 ; 5 ; -51 ; 11 تسمى أعدادا صحيحة نسبية .
- كل عدد صحيح نسبي هو عدد عشري نسبي .
- العدد مثل : 12,14 أو 2,5 - هو عدد عشري نسبي و ليس بعدد صحيح نسبي .

(3) – المستقيم المدرج :

نعتبر (D) مستقيما و O و I نقطتين مختلفتين من (D) . لندرج المستقيم (D) بواسطة القطعة [OI] (أظر الشكل أسفله) .



- كل نقطة من المستقيم (D) مرتبطة بعدد عشري نسبي يسمى أفصول هذه النقطة .
- النقطة O تسمى أصل المستقيم المدرج (D) .
- طول القطعة [OI] يسمى وحدة التدرج .

النقطة O أفصولها 0 النقطة A أفصولها 3 النقطة E أفصولها 4 -
النقطة I أفصولها 1 النقطة B أفصولها 3,5 النقطة F أفصولها 3,5 -

(4) – مسافة عدد عشري نسبي عن الصفر :

* تعريف 3 :

نعتبر (D) مستقيما مدرجا أصله O و M نقطة من (D) أفصولها العدد a .
مسافة العدد a عن الصفر هو طول القطعة [OM] .

(5) – مقابل عدد عشري :

* تعريف 4 :

يكون عدنان متقابلين إذا كانت لهما نفس المسافة عن الصفر و إشارتهما

* أمثلة : 11 و 11 - عدنان متقابلان ; 1,2 و 1,2 - عدنان متقابلان

0,32 و 0,32 - عدنان متقابلان ; 3 و 3 - عدنان متقابلان

مقابل العدد 0 هو العدد 0

II _ المقارنة :

(1) – مقارنة عددين عشريين مختلفين في الإشارة :

* قاعدة 1 :

كل عدد عشري موجب أكبر من كل عدد عشري سالب غير منعدم

* أمثلة : $0 < -33,12$; $0 < 25,44$; $1,5 < -0,45$; $-14,7 < 22$

(2) – مقارنة عددين عشريين سالبين :

* قاعدة 2 :

إذا كان عدنان عشريان سالبين فإن أكبرهما هو الأقرب من

* أمثلة : $0 > -2253$; $-36 > -0,1$; $-1 < -2,5$

* ملاحظة هامة : العدد 0 هو أكبر الأعداد السالبة و أصغر الأعداد الموجبة

(3) – الرمزان : $\geq$ و $\leq$.

الرمز $\geq$ يقرأ : أكبر من أو يساوي و يستعمل في حالتين مثل : $11,3 \geq 23$ و $33 \geq 33$
الرمز $\leq$ يقرأ : أصغر من أو يساوي و يستعمل في حالتين مثل : $1,5 \leq -37,5$ و $-7,6 \leq -7,6$

تقنيات :

لترتيب عدة أعداد عشرية نسبية نرتب الأعداد السالبة فيما بينها ثم نرتب الأعداد الموجبة فيما بينها ثم نرتب الكل

مثال :

لنرتب الأعداد : 11 ; $-14,6$; $5,9$; $-8,55$; -6 ; $-1,5$; 25 ; 0
لدينا : $0 < -1,5 < -6 < -8,55 < -14,6$ و $0 < 5,9 < 11 < 25$

إن $-14,6 < -8,55 < -6 < -1,5 < 0 < 5,9 < 11 < 25$